

CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
LXXVIII. PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS

Par A. GUILLAUMIN.
PROFESSEUR AU MUSÉUM.

- Senebiera integrifolia* DC. — Magenta (*Cribs*, 776).
Heritiera littoralis Ait. — Canala, Wagap (*Vieillard*, 162).
Commersonia Bartramia Merr. — Ounia (*Deplanche* in *Vieillard*, 311), Wagap, Canala (*Vieillard*, 311), Poume (*Deplanche*, 50).
Maxwellia lepidota Baill. — Nouvelle-Calédonie (*Pancker*), Dom-béa, Mont Dore (*Vieillard*, 235), Poume, Gatope (*Deplanche*, 249), Gomonen (*Deplanche*).
Grewia crenata Schinz et Guillaum. — Nouméa (*Vieillard*, 36), Gatope (*Vieillard*, 158-159).
Triumfetta procumbens Forst. — Wagap (*Vieillard*, 157), Wagap, Touho (*Vieillard*, 157).
T. rhomboidea Jacq. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* in *Vieillard*, 156).
Elæocarpus alaternoides Brong. et Gris. — Nouvelle-Calédonie (*Pancker*, 164, 188), Montagne du Lac, baie d'Amata, Canala (*Deplanche*, 158).
E. Lecardii Guillaum. — Wagap (*Vieillard*, 2156, 2356).
E. ovigerus Brong. et Gris. — Pouébo (*Deplanche*, 179, 218 in *Vieillard*, 265).
E. prunifolius Schltr. — Wagap (*Vieillard*, 2212).
E. retusus Brong. et Gris. — Baie de Tupiti (*Deplanche* in *Vieillard*, 169), Gatope (*Deplanche*, 279).
E. rotundifolius Brong. et Gris. — Wagap (*Vieillard*, 2357).
E. yateensis Guillaum. — Mont Koghi (*Pancker*), Wagap (*Vieillard*, 2145), Balade (*Vieillard*, 171 pro parte).
Antholoma montana Labill. — Pouébo (*Deplanche*, 18).
Hugonia Lenormandii Vieill. ex Guillaum. — Wagap (*Vieillard*, 2242).
H. neo-caledonica Vieill. ex Guillaum. — Wagap (*Vieillard*, 934).
Acridocarpus austro-caledonicus Baill. — Poume (*Deplanche*, 112, 201).
Rysopteris angustifolius Ndzu. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche*, 144), Cap Tonnerre (*Deplanche*, 144), Gatope (*Vieillard*, 2371, *Deplanche*, 271), Tanlé (*Deplanche*, 136), Cap Deverd (*Deplanche*, 270 in *Pancker*, 16), île Iandé (*Vieillard*, 2372, *Deplanche*, 270).

* *R. grandifolia* Guillaum. sp. nov.

Sarmentosus, ramis novellis appresse cinereo pilosis, deinde glabres.

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. XIV, n° 4, 1942.

centibus. Folia late ovata vel suborbicularia (4-14 cm. × 4-13 cm.), basi cordata, apice obtusa, rotundata retusave, rigide membranacea, supra glabra, subtus costa excepta glabra, deinde glaberrima, petiolo 1-5 cm. longo, primum appresse cinereo piloso, deinde glabrescente, apice 2-glanduloso, nervis 5-jugis, subtus prominentibus, stipulis ovatis, pilosis. Umbellæ ramulorum apice terminales aliquandoque axillares, multifloræ, pedunculo 2-2,5 cm. longo, appresse cinereo piloso, pedicellis 1,5 cm. longis, medio articulatis et bracteolis 2, glabris, minimis munitis, supra et infra articulationem similiter dense cinereo pilosis, floribus 2 cm. latis, sepalis suborbicularibus, 3 mm. longis, basin marginesque versus cinereo pilosis; petalis e basi unguiculata suborbicularibus, margine erosionis, 8 mm. longis, staminibus filamentis 2 mm. longis, quam antheræ glaberrimæ vix longioribus. Samaræ 4 cm. longæ, oblique obovatæ, margine curvata, exteriore undulata, basi pilosæ.

Canala (Vieillard, 251 = 2370), Touho (Vieillard, 2370), Pouandou près Wagap (Vieillard, 2370).

Oxalis Elsæ Knuth. — Nouvelle-Calédonie (Pancher, 21), Cap Tonneire (Deplanche, 143), Port boisé Deplanche, 296), Cap Tonneire, Port boisé (Vieillard 2440).

O. Novæ-Caledoniæ Knuth. — Canala, Gatope (Vieillard, 268).

O. repens Thunb. — Lifou (Deplanche).

Zieridium gracile Baill. — Gomonen (Vieillard, 2464).

E. pseud' obtusifolium Guillaum. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche, 303, 309, Vieillard, 2459), Gatope (Vieillard, 294 bis) Wagap (Vieillard, 2459 bis), Balade (Vieillard, 294 bis, 2456), Canala (Vieillard, 2460 ?), baie de Tupiti (Deplanche, 302 in Vieillard, 2460), Pouébo (Deplanche, 309 in Mus. néocal., 24, Vieillard, 2462).

Eriostemon pallidum Schltr. — Nouvelle-Calédonie (Deplanche in Vieillard, 68).

Myrtopsis myrtoidea Guillaum. — Canala (Vieillard, 2247), Pouébo, Tanlé (Deplanche, 298, Vieillard, 272 ? pro parte).

M. Novæ -Caledoniæ Engl. — Païta (Vieillard, 276), Yaté (Vieillard, 237), Canala (Vieillard, 2242), Grande Paaba, Tanlé (Deplanche, 70, 91), Paulotche près Gatope (Vieillard, 2244).

**Melicope diversifolia* Guillaum. sp. nov.

Frutex, ramis gracilibus, primum fulvo puberulis, deinde glabrescentibus, foliis oppositis, omnibus simplicibus, ovatis (5-11 cm. × 3-6 cm.), basi apiceque obtusis, 1-2 cm. petiolatis, omnibus 3-foliolatis, foliolis ovatis (8-10 cm. × circa 5 cm.), apice obtusis, basi centrali æqualiter, laterilibus asymmetrice anguste cuneatis, 3-5 cm. petiolatis, vel in eodem ramo simplicibus et 3-foliolatis, lamina rigide membranacea, supra sparse, subtus densius præsertim costa nervisque fulvo puberulis, nervis 8-10 jugis, tenuibus, subtus tantum prominulis, procul a margine conjunctis. Inflorescentiæ axillares, cymosæ, cymis elementaribus 3-floris, 1-3 cm. longæ, dense breviterque fulvo puberulæ, pedicellis floribus 2-plo longioribus, dense breviterque fulvo puberulis, sepalis 4, valvatis, extra breviter pube-

rulis, petalis 4, leviter imbricatis, ovatis, 2 mm. longis, dorso ad medium breviter puberulis, staminibus 8, in flore ♀ sterilibus, minimis, glabris, ovario 4-carpellato, breviter puberulo, ovulis in quoque loculo 2. Fructus vulgo 1-carpellati, 5 mm. longi, breviter puberuli.

Balade (*Vieillard*, 295).

M. lasioneura Baill. ex Guillaum. — Canala (*Vieillard*, 2467).

M. triphylla Merr. — Yaté (*Vieillard*, 297), « *Tineng* » à Lifou.

Comptonella albiflora Bak. f. — Baie de Tupiti, rivière de Tonn'du (*Deplanche*), Néhoué (*Deplanche*, 25 in Mus. néocal.). Balade, Tupiti, Wagap (*Vieillard*, 300 = 2272) Cap Tonnerre (*Deplanche*, 193) Gatope (*Deplanche*, 309).

Evodia ignambiensis Guillaum. — Balade (*Vieillard*, 308), Pouébo (*Deplanche*, 23 in Mus. noecal.).

***E. wagapensis** Guillaum. sp. nov.

Ramis primum fulvo puberulis deinde glabrescentibus, foliis oppositis, simplicibus, ovatis (10-17 cm. × 5-7, 5 cm.), basi cuneatis, apice acuminatis, rigidis, costa subtus excepta glaberrimis, nervis 8-11 jugis, tenuibus, procul a margine arcuatis. Inflorescentiae axillares, 4-7 cm. longae, pyramidali paniculatae; fulvo puberulæ, alabastris tantum valde juvenilibus extra fulvo puberulis, sepalis 4, ovatis, 1 mm. longis, imbricatis, extra fulvo puberulis, petalis 4, ovatis, extra pilosis, staminibus 4, filamentis antheris æquilongis. Fructus 2 mm. longi.

Wagap (*Vieillard*, 2241-2463).

Fagara Le Rati Guillaum. — Sans localité (*Vieillard*), Mont Dore (*Vieillard*, 284).

F. pinnata Engl. — Poume (*Deplanche*, 297), Gomonen (*Vieillard*, 2452), îles Iandé, Bélep (*Vieillard*, 2451).

F. Schlechteri Guillaum. — Wagap (*Vieillard*, 2430, 2440, 2450), Tiaré (*Deplanche*, 289).

Geijera Balansæ Guillaum. et Schinz. — Canala (*Vieillard*, 2465).

Bauerella Baueri Engl. — Nouméa (*Vieillard*, 200, 2380, 2703), Houaïlou (*Vieillard*, 200, 2704).

Acronychia lœvis Forst. — Canala (*Vieillard*, 285), Pouébo (*Deplanche*, 7, 307).

Halfordia Kendack Guillaum. — Poume (*Vieillard*, 58).

Micromelum minutum W. et Arn. — Thio (*Deplanche*, 5), Lifou (*Vieillard*, 290).

Murraya crenulata Oliv. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche*, 9), Balade (*Vieillard*, 286), Lifou (*Deplanche*, 8), « *Pinfela* » à Lifou.

M. exotica DC. — Nouméa (*Vieillard*, 312), Gatope (*Deplanche*, 6).

Citrus macroptera Montr. — Nouméa (*Vieillard*, 201), Hienghène, Wagap, Nouméa (*Vieillard*, 201), Canala, Hienghène, Balade (*Vieillard*, 201).

C. Oxanthera Beauvis. — Cap Tonnerre (*Deplanche*, 140), Gatope (*Deplanche*, 12 in Mus. neocal.).

Suriana maritima L. — Sans localité (*Vieillard*, 8, *Deplanche*), Balade (*Vieillard*, 428), île Nou ? (*Vieillard*, 98).

var. *Deplanchei* Guillaum. var. nov. — *S. Deplanchei* Vieill. mss. = *S. elegans* Vieill. mss.

Soulamea cardioptera Baill. — Paulotche près Gatope (*Vieillard*, 2418),

Petiolis glabrescentibus, foliorum lamina fere glaberrima.

Poume (*Deplanche*, 278 bis, *Vieillard*, 2415), Gatope (*Vieillard*, 2420).

S. fraxinifolia Brong. et Gris. — Canala (*Vieillard*, 2419).

S. Muelleri Brong. et Gris. — Gomonen (*Vieillard*, 2416), Gatope (*Vieillard*, 2421), île Tanlé (*Vieillard*, 2417, *Deplanche*, 129).

S. Pancheri Brong. et Gris. — Wagap (*Vieillard*, 243), Balade (*Vieillard*, 243).

Salacia Bailloniana Loes. — Wagap (*Vieillard*, 2300), Pouébo (*Vieillard*, 2299, *Deplanche*, 314).

S. Pancheri Baill. — Païta (*Vieillard*, 869), Canala (*Vieillard*, 2299), Balade (*Vieillard*, 320).

Emmenospermum Pancherianum Baill. — Nouméa (*Vieillard*, 2295, *Deplanche*, 250).

Phelline Billardieri Panch. — Sans localité (*Vieillard A D*), Wagap (*Vieillard*, 350-351), Balade (*Vieillard*, 350), Gatope (*Vieillard*, 2471 ?, 2472).

P. brachyphylla Baill. — Wagap (*Vieillard*, 350 bis).

P. comosa Labill. — Pouébo (*Deplanche*, 172 in Mus. neocal., 26), route Houailou-Koua (*Le Rat*, 2436).

P. erubescens Baill. — Pouébo (*Deplanche*, 160).

Anisomallon clusiæfolium Baill. — Sans localité (*Pancher*, 28).

Sarcanthidion sarmentosum Baill. — Poume, Pic de Pouébo (*Vieillard*, 2375).

Cossignia trifoliata Radlk. — Poume (*Vieillard*, 2447, 2382, *Deplanche*, 7, 119, 185).

Loxodiscus coriaceus Hook. f. — Paulotche près Gatope (*Vieillard*, 281).

Euroschinus elegans Engl. — Sans localité (*Petit*, 21 pro parte, *Pancher*, 197), Canala (*Vieillard*, 2676), col de Tonghoué (*Brousmiche*, 700), Gatope (*Vieillard*, 2675).

E. obtusifolius Engl. — Sans localité (*Petit*, 21 pro parte), île des Pins (*Pancher*).

E. verrucosus Engl. — Mont Koghi, baie de Prony (*Pancher*, 28).

S. Vieillardii Engl. — Sans localité (*Brousmiche*).

L'échantillon Balade (*Vieillard*, 40) étiqueté *E. Vieillardii* par Engler dans l'herbier du Muséum de Paris est constitué par une

- inflorescence sans fleurs qui paraît bien appartenir à cette espèce et une feuille qui est certainement une feuille de *Dysoxylum*.
Schinus terebinthifolius Raddi. — Anse Vata (*Brousmiche*).
Semecarpus atra Vieillard. — M'bée (*Vieillard*, 355).
**Combretum coccineum* Lam. — Nouméa : Jardin du Gouvernement, introduit à Yahoué (*Broumische*).
Terminalia novo-caledonica Dänik. — Sans localité (*Balansa*, 3555), Poume (*Deplanche*, 351), Ouen (*Vieillard*, 2568 in *Pancker*, 49).
T. litoralis Secm. Les échantillons : Nouméa (*Balansa*, 1313), île Sainte-Marie (*Franc*, 2281) se rapportent à cette espèce et non au *T. Catappa*. C'est vraisemblablement à elle qu'appartient la plante étiquetée « *T. elliptica* n. sp. », dans la collection Pancker.
Xanthostemon myrtifolium Pamp. ? — Canala (*Vieillard*, 2449).
Eugenia Mendute Guillaum. — Lifou (*Vieillard*, 2361).
Maba fasciculosa F. Muell. — Ile des Pins (*Pancker*).
Symplocos lucida Vieill. ex Guillaum. — Nouvelle-Calédonie (*Pancker*).
Mollugo nudicaulis Lam. — Poume (*Deplanche*, 95, 153).
Amarantus interruptus R. Br. — Plaine de la Tamoa (*Balansa*, 2777), Bourail (*Balansa*, 1028).
A gracilis Desf. — Nouvelle-Calédonie (*Germain*).
**Alternanthera ficoidea* Rœm. et Schult. — La Conception (de Pompéry).
**Rhagodia linifolia* R. Br. — Ile Nou (*Pancker*), île Nui (*Deplanche*, 204).
**R. nutans* R. Br. — Ile Nou (*Pancker*), île Nui (*Deplanche*, 205).
**Kochia hirsuta* Nolli. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche*, 207, *Germain*). Ile Isie (*Balansa*, 1051).
Ce dernier échantillon est dépourvu de fruits, mais on peut se demander si l'étiquette n'a pas été transposée, car Balansa a noté « Périgone charnu blanc ».
**Chenopodium murale* L. — Nouméa (*Pancker*, 439), Nouvelle-Calédonie (*Pancker*, *Germain*).
Salicornia australis Soland. in Forst. — Nouvelle-Calédonie et île des Pins (*Pancker*, 443 et sans n°), île des Pins (*Mme Le Rat*, 100).
Amborella trichopoda Baill. — Wagap (*Vieillard*, 2296).
Wikstræmia viridiflora Meissn. — Wagap (*Vieillard*, 1081 = 1079), Pouébo (*Deplanche*, 423).
Var. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche*, 446 bis in *Pancker*, 89), Poila, Gatope (*Vieillard*, 1080), Tanlé, Gatope (*Vieillard*, 3152).
Hemicyclia Deplanchei Baill. ex Guillaum. — Nouméa (*Vieillard*, 3229), Gatope (*Vieillard*, 2285) ?
Balanops Pancheri Baill. — Sans localité (*Vieillard* x).